

雜 錄 Miscellaneous

○*Bladhia punctata* (LINDLEY) NAKAI ノ名ハ生キル (御江久夫)

嘗ツテからたちばな即チ *Bladhia crispa* THUNBERG ニ用ヒラレタ學名ノーツニ *B. punctata* (LINDLEY) NAKAI ト云フノガアル。此レハ *Ardisia punctata* LINDLEY カラ導カレタ組合セデアル事ハ言フ迄モ無イガ、此ノ植物ハ元來、南支那ノ植物デ HANDEL-MAZZETTI ノ説ノ如ク、からたちばなトハ可成リ異ツタ種類デアル。筆者ハ此ノ日支事變ノ始ツタ年、即チ昭和 12 年ノ春ト夏 2 回福州附近ノ山地デ本種ヲ採ツタ事ガアルガ、葉ハ長橢圓狀披針形デ質厚ク、花序ハ勿論、幹モ二年前位ノ所迄ハ褐色ノ毛ガ密生シテ居ルノデ直ニ區別出來ル。其レデ此レヲ元通り獨立ノ別種トシテ且又 *Bladhia* 屬トシテ取扱フトスレバ學名ハドウスレバ宜シイカ。筆者ニハ其ノ處置法ガ良ク判ラナイガ命名規約第 54 條ノ後半ヲ適用シテ下記ノ名ヲ起用ス可キデハ無イカト考ヘル。

Bladhia punctata (LINDLEY) NAKAI, Trees & Shrubs Jap. ed. I, vol. I, p. 209 (1922), nomen tantum.

Syn. *Ardisia punctata* LINDLEY in Bot. Reg. X, pl. 827 (1824); MEZ in ENGLER, Pflanzenreich, Heft 9, p. 142 (1902) pro parte? : HANDEL-MAZZETTI, Symb. Sin. VII, p. 755 (1936).

Tinus punctata (LINDLEY) O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. II, p. 974 (1891).

Ardisia crispa (non DC.) MEZ in ENGLER, Pflanzenreich, Heft 9, p. 144 (1902) pro parte, quoad specimen Warburgi no. 5774.

Hab. in China australi.

(H. Migo)

上記ノ MEZ ガ *A. punctata* トシテ記載シテ居ルモノハ其ノ文面ト名稱カラ判斷シテ本種ヲ指スモノデアル事ニ疑問ノ餘地ハ無イ様ニ見エルガ、末尾ニ本種ガ日本デ栽培サレテ居ルト書イテ居ル事カラ判斷スレバ——本種ガ日本デ栽培サレテ居ルトハ一寸考ヘラレナイカラ——からたちばなヤまんりやう等ノ栽培品ト本種トヲ混同シテ居ルノデハナイカト云フ疑問ガ涌イテ來ル。併シ其ノ邊ノ結論ハ MEZ ノ引用標本ヲ實見シナイ事ニハ不可能ナノデ暫ク差控ヘー先ツ上記ノ様ニ疑問符ヲ附スルニ留メル。大體本種ニ限ラズからたちばなヤまんりやうハ文献ガ非常ニ混亂シテ居ル様ニ思ヘルガ、其ノ整理ハ筆者ノ境遇ヤ能力デハ手ニ負ヘナイ事ナノデ是レ亦觸レナイデ置ク。ナホ LINDLEY ガ Botanical Register ニ圖説シテ居ル所ノ本種ハ幹ノ先端ニ數個ノ花序ガ集合シテ居ル様ニ畫イテアルガ、ソウ云フ状態ノモノニハ筆者ハ未ダ行キ當ツタ経験ガ無い。

○おにじゅずだま支那ニモアリ (御江久夫)

じゅずだまハ支那デハ少シモ珍ラシイモノデハナイガ、おにじゅずだまハ未ダ知ラレテ


居ナイ様デアルカラ一寸報告スル。引用標本ノ内四川産ハ寺院ノ栽培品デアルガ貴州産ハ栽培品カ自生品カ不明デアル。

Coix Lachryma-Jobi L. var. maxima MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XX, p. 10 (1906); HONDA, Monogr. Poa. p. 416 (1930).

Hab. Prov. Szechuan—Mt. Omei, cult. (H. Y. Ho, Sept. 29, 1935, no. 9982); Prov. Kweichow—Tuhshan, border of Kwangsi (Y. TSIANG, Aug. 20, 1930, no. 6491). (H. Migo)

○きうりノ畸形品 (大田繁則)

きうりノ畸形品トシテ第1圖ノ如キモノヲ筆者ハ先年觀察略寫シテ置イタ。果實上ニ葉ヲ持ツモノハ既ニ知ラレテキルモノデアルガ、之ハ少シク畸形ノ度ヲ深メテキルノデ茲ニ報告スル次第デアル。即チ二果接着、一葉附着ノモノデアル。第2圖ニ示スモノハきうりノ卷鬚上ニ雄花ヲ持ツタモノデアル。斯様ナモノガ數株アラハレ、アルモノハ卷鬚ガ分岐シテ其ノ一方ニ雄花ヲ持ツタ何レモ卷鬚ノ基部カラ 10 cm 内外離レタ位置ニ雄花ヲ持チ、卷鬚ノ基部又ハ先端部ニ蕾ヲ持テルモノハ無カツタ。



第1圖 きうりノ畸形品(×1/3)
(1935年6月28日大田寫生)



第2圖 きうりノ卷鬚上ニ雄花咲ク
(×1/7) (1939年6月9日大田撮影)

雌花ヲ持ツタモノハ未ダ觀察シナイガ雌花ナレバー層面白イト思フ。

○岩政定治氏ノ種子ケ島ノ採集品 (津山 尙)

1937年4月ニ廣島文理科學大學デ蘚苔類ヲ専心研究中ノ岩政氏ハ堀川博士ニ隨ツテ種子ケ島ヲ採集シタ。採集ノ主目的ハ蘚苔ニアツタガ、同氏ハ顯花植物モ採集シタ。ソノ中ニアツタ注意スベキモノ2種ヲ紹介スル。

1. **Clematis crassifolia** BENTHAM, Fl. Honkong. p. 7 (1861) やまはんしゃうづる同島ノ古田官有林デ採ツタモノ。三小葉ハ非常ニ厚ク、鈍頭デ香港ノ植物ニヨル BENTHAMノ原記載ニヨク一致スル。惜イ事ニ花ガナイケレドモ、コノ種デアル事ニ間違ハナイト思